

Rasgos neurológicos frecuentes de MPS subtipo ⁶

Hallazgos neurológicos	MPS I-H	MPS I-H/S	MPS I-S	MPS II, de progresión rápida	MPS II, de progresión lenta	MPS III	MPS IV	MPS VI	MPS VII
Retraso en el desarrollo	++	+	-	++	-	++	-	-	++
Trastornos del comportamiento	-	-	-	++	-	++	-	-	-
Convulsiones	-	-	-	++	-	++	-	-	+
Hidrocefalia	++	+	-	++	+	++	+	++	-
Atrofia cerebral	+	-	-	++	-	++	-	-	-
Quistes aracnoides	+	+	+	+	+	+	-	+	-
Lesiones quísticas	++	+	+	++	+	+	-	++	-
Sordera neurosensorial	++	++	++	++	++	++	+	++	+
Edema papilar/atrofia óptica	++	++	-	++	++	+	-	++	+
Subluxación /compresión medular C1-C2	+	-	-	-	-	-	++	+	+
Paquimeningitis cervical	+	++	+	-	+	-	-	++	-
Síndrome de túnel carpiano	++	++	++	++	++	-	+	++	-

++ Común + Frecuente - Poco frecuente o no informada

Adaptado de Kakkis, *Principles of Child Neurology*, 1996.

Abreviaturas: MPS, mucopolisacaridosis; MPS I-H, mucopolisacaridosis Síndrome de Hurler; MPS I-H/S, mucopolisacaridosis Síndrome Hurler-Scheie; MPS I-S, mucopolisacaridosis Síndrome de Scheie.