

Rasgos neurológicos frecuentes de MPS por subtipo ¹³

Hallazgos neurológicos	MPS I-H	MPS I-H/S	MPS I-S	MPS II, severa	MPS II, leve	MPS III	MPS IV	MPS VI	MPS VII
Retraso en el desarrollo cognitivo	++	+	—	++	—	++	—	—	++
Trastornos del comportamiento	—	—	—	++	—	++	—	—	—
Convulsiones	—	—	—	++	—	++	—	—	+
Hidrocefalia	++	+	—	++	+	++	+	++	—
Atrofia cerebral	+	—	—	++	—	++	—	—	—
Quiistes aracnoides	+	+	+	+	+	+	—	+	—
Lesiones quísticas	++	+	+	++	+	+	—	++	—
Sordera neurosensorial	++	++	++	++	++	++	+	++	+
Edema papilar/atrofia óptica	++	++	—	++	++	+	—	++	+
Subluxación /compresión medular C1-C2	+	—	—	—	—	—	++	+	+
Paquimeningitis cervical	+	++	+	—	+	—	—	++	—
Síndrome de túnel carpiano	++	++	++	++	++	—	+	++	—

++ Común + Frecuente — Poco frecuente o no informada

Adaptado de Kakkis, *Principles of Child Neurology*, 1996.

Abreviaturas: MPS, mucopolisacaridosis ; MPS I-H, Síndrome de Hurler; MPS I-H/S, Síndrome Hurler-Scheie; MPS I-S, Síndrome de Scheie.