

Principales manifestaciones musculoesqueléticas de MPS según el tipo de enfermedad⁸

| Enfermedad | Manifestaciones musculoesqueléticas |
|----------------------------------|--|
| MPS I /Síndrome de Hurler | Disostosis múltiple, baja estatura desproporcionada, contracturas articulares, CTS, hipoplasia odontoidea, inestabilidad atlanto-axial, displasia acetabular, coxa valga, genu valgo, dedos en gatillo |
| MPS I /Hurler–Scheie, Scheie | Manifestaciones más leves del síndrome de Hurler |
| MPS II/Hunter | Disostosis múltiple, baja estatura desproporcionada, contracturas articulares, CTS, hipoplasia odontoidea, inestabilidad atlanto-axial, displasia acetabular, coxa valga, genu valgo, dedos en gatillo |
| MPS III/Sanfilippo | Solamente manifestaciones somáticas leves, baja estatura y contracturas leves en una pequeñas proporción (principalmente la articulación del codo) |
| MPS IVA/Morquio A | Displasia esquelética severa, disostosis múltiple, baja estatura desproporcionada, hiper movilidad articular, hipoplasia odontoidea, inestabilidad atlanto-axial, displasia acetabular, dislocaciones de cadera, coxa valga, genu valgo, pie plano, pectus carinatum |
| MPS VI/Maroteaux–Lamy | Disostosis múltiple, baja estatura desproporcionada, contracturas articulares, CTS, hipoplasia odontoidea, inestabilidad atlanto-axial, displasia acetabular, coxa valga, genu valgo, dedos en gatillo, pectus carinatum |
| MPS VII/Sly | Disostosis múltiple, baja estatura desproporcionada, contracturas articulares, CTS, hipoplasia odontoidea, inestabilidad atlanto-axial, displasia acetabular, coxa valga, pectus carinatum |
| MPS IX/deficiencia hialuronidasa | Baja estatura, masas de tejido conectivo periarticular, masas sinoviales nodulares, efusiones articulares, erosiones acetabulares |

Adaptado de Morishita, *Rheumatology*, 2011.

Abreviaturas: CTS, síndrome de túnel carpiano.